

Godkänt: 2021-05-19
Giltigt t.o.m: 2024-05-19Ver.nr: 2.0
Dnr:

Röntgen halsrygg bröstrygg ländrygg remittent

Dosklass I, hals- och bröstrygg. Dosklass II, ländrygg



Dosklass I och II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

Indikation/frågeställning

- Förekomst av kotkompression. *Ålder kan vara svårvärderad.*
- Spondylos. *Degenerativa förändringar är dock vanliga och ej specifika. Dåligt samband mellan fynd vid röntgenundersökning och ospecifik ryggsmärta.*
- Ankyloserande spondylit. *Diagnoskriterier baseras dock på SI-lederna.*
- Missbildningar
- Skolios
- Fraktur. *Utreds i första hand med DT, särskilt efter trauma.*
- Destruktion. *Utreds i första hand med DT eller MRT då förändringar i tidigt skede är svåra att påvisa med konventionell röntgen.*

Kontraindikation –

Remissinnehåll

Uppgift om typ av trauma samt lokalstatus. Yttre felställningar. Neurologiska bortfall. Laboratorieparametrar tydande på inflammation eller infektion. Maligna tecken.

Patientförberedelser

Ytliga främmande föremål borttages, ex smycken

Kontrastmedel/läkemedel -

Utförande

Halsrygg, liggande eller sittande i 4 projektioner.
Bröst- och ländrygg, 2 projektioner i liggande. Det ingår en översiktlig bedömning av SI-leder på L - 5 frontalen SI-leder med invinklade bilder beställes separat.

Vid skoliosundersökning på barn och ungdomar utföres stående undersökning för bedömning av skoliosvinklar enligt Cobb.

Eftervård -

