

Godkänt
2021-02-04Giltigt t.o.m
2024-02-04Versionsnummer
1.0

Diarienummer

Vaccinering vid Waran OAK Region Dalarna

Lagrum och styrande förutsättningar

Syfte

Beskrivning av rutin vid vaccinering av covid-19 då patient står på blodförtunnande medel om Waran eller OAK.

Beskrivning

Vaccination mot covid-19 ska ske strikt intramuskulärt oavsett medicinering.

Patienter som står på Waran tillfrågas om behandlingen är stabil, dvs. ingen dosändring har behövts sista två veckorna. Om så är fallet ges vaccinationen. Om dosändring skett sista två veckorna så ska senaste PK(INR) ha varit under 3,0. Var det högre får patienten återkomma efter nytt prov.

Medicinering med andra orala antikoagulantia (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana) eller lågmolekylärt heparin (Innohep) är inte kontraindikation. Tidpunkten för vaccinationen saknar betydelse.

Patienter som medicinerar med något av ovanstående preparat ska instrueras att trycka så hårt som möjligt på injektionsstället i 2-3 minuter efter injektionen, för att minska risken för hematom. Detta kan förstås även göras av anhörig/personal.

Medicinering med en eller två trombocythämmare (Trombyl, Klopido, Brilique, Efix) saknar betydelse för vaccinationen. Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0. Då ska även tryck utövas, enligt ovan.