

Datortomografi hals larynx remittent



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

Indikation - Frågeställning

- Tumörer i epi-, oro- och hypopharynx.
- Förstorade lymfkörtlar. Lymfom.
- Abscess.
- Venösa trombosor.
- Cystor.
- Spottkörtelförändringar. Konkrement.
- Tracheal påverkan.
- Larynxförändringar eller traumatiska skador.
- Thyreoideaförändringar.
- Perforation. Spontan eller iatrogen.

Vid kärlfågeställningar på artärsidan utföres ultraljud med doppler eller DT-angiografi med kontrast.

Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

Remissinnehåll

- Anamnes. Palpationsfynd. Om känd tumör ska typ och lokalisation av tumör anges. Tidigare operationer, strål- och cellgiftbehandlingar.
- Kreatininvärde.

Patientförberedelser

Plocka bort smycken. Grön eller rosa venflon i armvecket.

Kontrastmedel/läkemedel

- Ibland per oral kontrast vid perforationsmisstanke. Drickes på röntgenavdelningen.
- I regel jodkontrast iv.
- Kontrastmedel får ej ges om obehandlad hyperthyreos (thyreotoxicos).
- Kontrastmedel får ej ges om misstänkt/konstaterad thyreoideacancer och radiojodbehandling planeras.
- Försiktighet om thyreostatikabehandlad hyperthyreos.

(Se vidare om kontrastmedelsreaktioner i Kontrastmedelsöverkänslighet)

Utförande

Undersökes i ryggläge med tunna snitt under kontrastinjektion.

Om många stora tandlagningar ger artefakter och omöjliggör diagnostik kan MRT övervägas.

Eftervård

-