

## Datortomografi tunntarm remittent

---



Dosklass IV: Extra hänsyn till strålrisk för alla åldrar

### Indikation - Frågeställning

- Striktur - ileusorsak?
- Tumör.
- Adenom.
- Polyp.
- Divertikel

MB Crohn us med MRT tunntarm.

### Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

### Remissinnehåll

- Vad har tidigare utredning visat. Undersökningen utföres i regel som en mera klarläggande undersökning efter tidigare rutin DT buk.
- Kreatinin.

### Patientförberedelser

- Fasta 4 timmar.
- Grön eller rosa nål.

### Kontrastmedel/läkemedel

Patienten dricker 1,4 l sorbitollösning kontinuerligt under 45 minuter ända fram till undersökningen. T Primperan 10 mg ges för att stimulera tarmperistaltiken. Jodbaserad kontrast ges iv med tryckspruta.

(Se vidare om kontrastmedelsreaktioner i Kontrastmedelsöverkänslighet)

### Utförande

Hela buken undersöks i två serier med iv kontrast i sen artär- resp. venfas. Iv injektion Buscopan 20 mg ges direkt innan för att dämpa tarmrörelser.

### Eftervård

-